

PARTIE II Mise au repos de la Reine et divisions.

Myriam raconte qu'un essaimage se fait généralement lorsque le ciel est bleu et entre midi et 14 h. Lors de la visite de la première ruche, elle constate que la hausse est remplie de miel aux $\frac{3}{4}$ et qu'il est temps d'ajouter une seconde hausse.



La hausse est quasi pleine de bon miel



Lors de la visite des corps de ruche, elle rencontre pas moins de huit cellules royales, toutes occupées, ce qui signifie qu'aucune autre Reine n'est encore née.

Dans la première ruche ouverte, la colonie n'a pas encore essaimé, Myriam constate la présence de la Reine en ponte qui est marquée de 2015.

Elle intervient pour éviter l'essaimage. La solution consiste à peupler une ruchette en prélevant des abeilles dans la colonie en fièvre d'essaimage, tout en lui conservant son potentiel de production.

Lorsque les butineuses sont à



l'extérieur, une ruchette (ici Myriam a utilisé une Dadant 10 cadres et a placé des partitions pour restreindre l'espace en rive) est placée à côté de la ruche-souche. Elle dépose dans la ruchette le cadre de couvain avec la reine qu'elle va mettre au repos et deux cadres de couvain operculé, sans cellule royale, couverts de jeunes abeilles (en pleine journée, la plupart des butineuses sont à l'extérieur et les abeilles présentes dans la ruche sont jeunes et se trouvent de préférence sur le couvain, celles-ci n'ont pas encore mémorisé l'emplacement de leur ruche - elles peuvent être déplacées sans qu'elles retournent à leur ancien emplacement, contrairement aux butineuses).

Le fait d'enlever la Reine, les abeilles n'auront plus envie de partir.

Dans la ruche-souche, Myriam laisse une seule cellule royale non operculée

Elle aurait dû détruire les autres mais a préféré multiplier l'opération autant de fois qu'elle avait de cellules royales en s'aidant des autres ruches pour renforcer les divisions en couvain ou en nourriture

sans trop les déforcer. Elle va rafler d'ailleurs rafler tous les cadres bâtis ou non de réserve pour y arriver.

Des cadres de cire gaufrée remplacent les cadres de couvain qui ont été retirés. La ruche-souche va donc continuer la récolte puisque les butineuses sont revenues chez elle, et élever une nouvelle



En ce qui concerne les divisions :

Dans chaque ruchette, Myriam place un cadre avec une cellule royale non operculée, un cadre de couvain ouvert et un cadre de couvain fermé, un cadre de pollen et un de nourriture, ou des cadres bâti

Myriam replace la grille à Reine sur la ruche souche, ainsi qu'une hausse vide surmontée de la hausse quasi pleine. Comme dit ci-avant, toutes les butineuses qui se trouvent dans les ruchettes, dont la présence n'est plus utile, vont retourner à la ruche souche et continuer la récolte.

Enfin, Myriam nourrit les cirières (pour les aider à fabriquer la cire) à l'aide de Trimobee.

Une grille à Reine est placée devant le trou de vol contenant la Reine au repos. Si une deuxième Reine était présente dans la ruche, l'une d'elle serait tuée par l'autre.


A 18h00, je quitte le rucher tandis que Myriam accompagnée de quelques assidus finit les dernières ruches













Si les grands amateurs de larves avaient été là, ils auraient pu se régaler



Un petit rappel d'Agnès : pour une question d'hygiène, ne rien déposer à même le sol, mais plutôt sur le toit de la ruche retourné.